最优化练习题

要求：请写出详细的推导过程或证明过程。

1. 计算如下向量函数$F(\alpha,\beta)$关于α和β的雅可比矩阵:

$$F(\alpha,\beta)=\begin{pmatrix}\mathbf{diag}(e^{-\frac{\alpha}{\varepsilon}})\mathbf{K}e^{-\frac{\beta}{\varepsilon}}\\ \mathbf{diag}(e^{-\frac{\beta}{\varepsilon}})\mathbf{K}^{\top}e^{-\frac{\alpha}{\varepsilon}}\end{pmatrix}. \tag{1}$$

2. 考虑优化问题

$$\min_{x}\quad f(x)=x_1^2+2x_2^2+4x_1+4x_2.$$

(a) 证明如果使用精确线搜索的最速下降梯度法从初始点$x^1=(0,0)^{\top}$求解该问题，产生的点列为

$$x^{k+1}=\left(\frac{2}{3^k}-2,\left(-\frac{1}{3}\right)^k-1\right)^{\top}.$$

(b) 这个迭代点列收敛到哪一个点？收敛速度是什么？

3. 考虑函数$f(x)=x_1^2+x_2^2$，以及迭代点列$x^k=(1+\frac{1}{2^k})(\cos k,\sin k)^T$，请说明

(a) $\{f(x^{k+1})\}$ 是否收敛？若收敛，给出收敛速度。

(b) $\{x^{k+1}\}$ 是否收敛？若收敛，给出收敛速度。

4. 考虑对称矩阵的特征值问题

$$\min_{x\in\mathbb{R}^n}\quad x^TAx,\quad \text{s.t.}\quad \|x\|_2=1,$$

其中$A^T=A$。试分析其所有的局部极小点、鞍点以及全局极小点

5. 设可微函数$f(x)$的定义域$\mathbf{dom}f=\mathbb{R}^n$，如果梯度$\nabla f(x)$是$L$-利普希茨连续，即存在$L>0$有

$$\|\nabla f(x)-\nabla f(y)\|\le L\|x-y\|,\quad \forall\, x,y\in\mathbf{dom}f, \tag{2}$$

证明函数$f(x)$有二次上界：

$$f(y)\le f(x)+\nabla f(x)^{\mathrm{T}}(y-x)+\frac{L}{2}\|y-x\|^2,\quad \forall\, x,y\in\mathbf{dom}f. \tag{3}$$

6. 设函数$f(x)$是$\mathbf{dom}f=\mathbb{R}^n$上的凸可微函数。假设梯度$\nabla f(x)$是$L$-利普希茨连续，即存在$L>0$有

$$\|\nabla f(x)-\nabla f(y)\|\le L\|x-y\|,\quad \forall\, x,y\in\mathbf{dom}f, \tag{4}$$

证明：$\nabla f(x)$ 有余强制性, 即对任意的$x,y\in\mathbb{R}^n$, 有

$$(\nabla f(x)-\nabla f(y))^{\mathrm{T}}(x-y)\ge\frac{1}{L}\|\nabla f(x)-\nabla f(y)\|^2.$$

7. 设可微函数$f(x)$ 的定义域为$\mathbb{R}^n$ 且存在一个全局极小点x^*, 若$f(x)$ 为梯度L -利普希茨连续的, 则对任意的x 有

$$\frac{1}{2L}\|\nabla f(x)\|^2\le f(x)-f(x^*)\le\frac{L}{2}\|x-x^*\|_2^2.$$

8. 假设可微函数$f(x)$的梯度$\nabla f(x)$是L-利普希茨连续，且f是可微强凸函数，即存在常数$m > 0$使得对任意$x, y \in \mathbb{R}^n$和$\theta \in (0,1)$，有：

$$f(\theta x + (1-\theta)y) \le \theta f(x) + (1-\theta) f(y) - \frac{m}{2}\theta(1-\theta)\|x-y\|^2.$$

证明:

$$(\nabla f(x) - \nabla f(y))^{\mathrm{T}}(x-y) \ge \frac{mL}{m+L}\|x-y\|^2 + \frac{1}{m+L}\|\nabla f(x) - \nabla f(y)\|^2.$$

9. 假设函数$f(x)$可微且梯度$\nabla f(x)$是L-利普希茨连续. 从初始步长$t = \hat{t} > 0$开始考虑线搜索回退法. 如果不等式

$$f(x - t\nabla f(x)) < f(x) - \frac{t}{2}\|\nabla f(x)\|_2^2 \tag{5}$$

不满足，则缩小步长$t = \beta t$，其中$\beta \in (0,1)$，然后继续验证(5)是否满足. 证明回退法生成的步长满足$t \ge \min\{\hat{t}, \beta/L\}$.

10. 假设函数$f(x)$可微且梯度$\nabla f(x)$是L-利普希茨连续. 考虑无约束优化问题：

$$\min_{x\in\mathbb{R}^n} f(x).$$

- 写出求解该问题的梯度法。
- 假设$f(x)$为非凸函数，明确给出梯度法步长的取法并写出收敛性结果.
- 假设$f(x)$为凸函数，明确给出梯度法步长的取法并写出的收敛性(复杂度分析)结果.
- 假设$f(x)$为强凸函数，明确给出梯度法步长的取法并写出的收敛性(复杂度分析)结果.

11. （考虑可微函数$f(x): \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$和点列$\{x^i\}_{i=1}^{\infty}$。令$k \ge 2$，$s^{k-1} = x^k - x^{k-1}$ 以及$y^{k-1} = \nabla f(x^k) - \nabla f(x^{k-1})$。

(a) 请分别计算如下两个优化问题的全局最优解:

$$\min_{\alpha\in\mathbb{R}} \quad \|\alpha y^{k-1} - s^{k-1}\|_2^2, \tag{6}$$

$$\min_{\alpha\in\mathbb{R}} \quad \|y^{k-1} - \alpha^{-1} s^{k-1}\|_2^2. \tag{7}$$

(b) 请给出问题(6)和(7)构造合理性的一些直观解释。并根据它们构造求解优化问题$\min_x \ f(x)$的梯度算法。

12. 给定实对称矩阵$A \in \mathcal{S}^n$, $b \in \mathbb{R}^n$, $\Delta > 0$。考虑优化问题

$$\min_{x\in\mathbb{R}^n} \quad x^T A x + 2b^T x, \qquad \text{s.t.} \quad \|x\|_2 \le \Delta.$$

给出并证明点$z \in \mathbb{R}^n$ 是该问题最优解的充要条件。

13. 给定$A(x) = A_0 + x_1 A_1 + \cdots + x_n A_n$ 并且系数矩阵A_i 对称，令

$$f(x) = \lambda_{\max}(A(x)) = \sup_{\|y\|_2=1} y^{\mathrm{T}} A(x) y.$$

计算函数$f(x)$的一个次梯度.

14. 给定a_i和b_i，写出如下问题的一阶最优性条件:

$$\min_x \quad f(x) = \max_{i=1,\cdots,m} (a_i^{\mathrm{T}} x + b_i).$$

15. 设$f(x)$是适当且闭的强凸函数，其强凸参数为$\mu > 0$，$f^*(y)$是$f(x)$的共轭函数，则$f^*(y)$是梯度$\frac{1}{\mu}$-利普希茨连续的可微函数.

16. 考虑BFGS公式：

$$B_{k+1} = B_k - \frac{B_k s_k s_k^\top B_k}{s_k^\top B_k s_k} + \frac{y_k y_k^\top}{y_k^\top s_k}.$$

(a) 证明:

$$\mathrm{trace}(B_{k+1}) = \mathrm{trace}(B_k) - \frac{\|B_k s_k\|_2^2}{s_k^\top B_k s_k} + \frac{\|y_k\|_2^2}{y_k^\top s_k}.$$

(b) 证明：

$$\det(B_{k+1}) = \det(B_k)\frac{y_k^\top s_k}{s_k^\top B_k s_k}.$$

17. 假设x^*是最优化问题$\min_{x\in\mathbb{R}^n} \ f(x)$的最优解。假设函数$f(x)$二阶可微，海瑟矩阵$\nabla^2 f(x)$在$x^*$的一个领域内利普希茨连续且$\nabla^2 f(x^*)$严格正定。考虑牛顿算法

$$x_{k+1} = x_k + p, \quad p = -(\nabla^2 f(x_k))^{-1}\nabla f(x_k).$$

如果初始点x_0充分靠近x^*，证明迭代序列$\{x_k\}$收敛到x^*且收敛速度为二阶。

18. 设函数$f(x) = \|x\|^\beta$，其中$\beta > 0$为给定的常数。考虑步长为1的牛顿法对$f(x)$ 进行极小化，初值$x^0 \neq 0$。试证明：

(a) 若$\beta > 1$且$\beta \neq 2$，则x^k收敛到0 的速度为线性的；

(b) 若$0 < \beta < 1$，则牛顿法发散。

19. 给定向量$g \in \mathbb{R}^n$, 对称矩阵$B \in \mathbb{R}^{n\times n}$ 和信赖域半径Δ，考虑信赖域子问题：

$$\min_{p\in\mathbb{R}^n} \quad m(p) = g^\top p + \frac{1}{2}p^\top Bp, \quad \text{s.t.} \quad \|p\|_2 \le \Delta.$$

(a) 写出下面问题的最优解p^s：

$$p^s = \arg\min_{p\in\mathbb{R}^n} \quad g^\top p, \quad \text{s.t.} \quad \|p\|_2 \le \Delta.$$

(b) 写出下面问题的最优解τ：

$$\tau = \arg\min_{\tau\ge 0} \quad m(\tau p^s), \quad \text{s.t.} \quad \|\tau p^s\|_2 \le \Delta.$$

(c) 令科西步为$p^c = \tau p^s$。证明如下不等式：

$$m(0) - m(p^c) \ge \frac{1}{2}\|g\|_2 \min\left\{\Delta, \frac{\|g\|_2}{\|B\|_2}\right\}.$$

20. 给定连续可微函数$f(x)$ 和列向量$l, u \in \mathbb{R}^n$。考虑优化问题：

$$\min_{x\in\mathbb{R}^n} \ f(x), \ \text{s.t.} \ l \le x \le u. \tag{8}$$

(a) 给出点$x \in \mathbb{R}^n$到$[l, u]$的投影算子$P(x)$的显式表达式：

$$P(x) = \arg\min_y \|x - y\|_2^2, \ \text{s.t.} \ y \in [l, u].$$

(b) 对所有的$x \in \mathbb{R}^n$ 和任意$y \in [l, u]$，证明不等式$(P(x) - x)^\top(y - P(x)) \ge 0$成立。

(c) 对所有的$x, y \in \mathbb{R}^n$，证明不等式$(P(x) - P(y))^\top(x - y) \ge \|P(x) - P(y)\|_2^2$成立。

(d) 证明问题(8)的KKT条件等价于

$$x - P(x - \nabla f(x)) = 0.$$

(e) 写出求解问题(8)的投影梯度法，并给出一种全局收敛性结果。要求写清楚步长如何选取，以及保证该收敛性所需要的假设条件。

(f) 写出求解问题(8)的二次罚函数法。该二次罚函数是否可微？如果可微，给出其梯度的表达式。该二次罚函数是否二次可微？

(g) 写出求解问题(8)的增广拉格朗日函数法。要求写出: i) 具体的增广拉格朗日函数的表达式，并且该函数只有一个优化变量x。ii) 具体的乘子更新公式。

21. 给定对称矩阵$C \in \mathbb{R}^{n\times n}$，令$p$为正整数且$p \in [1, n]$，考虑优化问题:

$$\begin{aligned} \max_{Y\in\mathbb{R}^{n\times p}} \quad & f(Y) = \mathrm{Tr}(CYY^{\mathrm{T}}) \\ \text{s.t.} \quad & \mathrm{diag}(YY^{\mathrm{T}}) = \mathbf{1}, \end{aligned} \tag{9}$$

其中对于对称矩阵$X \in \mathbb{R}^{n\times n}$，$\mathrm{Tr}(X) = \sum_{i=1}^{n} X_{ii}$, $\mathrm{diag}(X) = [X_{11}, X_{22}, \cdots, X_{nn}]^{\mathrm{T}}$。

注：如果对矩阵形式相对不熟悉，可以先将变量写成向量形式: $Y = \begin{pmatrix} y_1^{\mathrm{T}} \\ \cdots \\ y_n^{\mathrm{T}} \end{pmatrix}$，其中$y_i \in \mathbb{R}^p$是列向量.

(a) 讨论可行点Y处线性无关约束品性(LICQ)是否满足？

(b) 写出目标函数$f(Y)$关于Y的梯度，估计梯度的利普希茨常数。

(c) 优化问题(9)的一阶最优性(KKT)条件。

(d) 二阶充分条件：假设在可行点Y处存在拉格朗日乘子满足KKT条件，如果拉格朗日函数的海瑟矩阵在临界锥上严格正定，则Y是问题(9)的严格局部极小点。请写出拉格朗日函数的海瑟矩阵(可以是矩阵形式或者算子形式)和临界锥具体形式。

(e) 假设Y是局部极小点，写出拉格朗日乘子的显式表达形式(只与C和Y有关)。

(f) 给定矩阵B，计算如下投影算子的最优解：

$$P(B) = \arg\min_{Y\in\mathbb{R}^{n\times p}} \|Y - B\|_F^2, \text{ s.t. } \mathrm{diag}(YY^{\mathrm{T}}) = \mathbf{1}. \tag{10}$$

(g) 请根据(10)写出求解问题(9)的投影梯度法，并参考无约束优化的线搜索条件给出一种步长选取条件。简要讨论该算法的全局收敛性以及保证该收敛性所需要的假设条件。

22. 给定矩阵$A \in \mathbb{R}^{m\times n}$和向量$b \in \mathbb{R}^m$，$\mu > 0$，考虑优化问题:

$$\min_x \quad \psi(x) = \mu\|x\|_1 + \frac{1}{2}\|Ax - b\|_2^2. \tag{11}$$

(a) 写出并验证$\psi(x)$的次梯度表达式。给出并证明问题(11)的最优性条件。

(b) 给出求解问题(11)的次梯度算法及其步长的取法，写出收敛性(复杂度分析)结果。

(c) 写出邻近算子的具体表达式:

$$\mathrm{prox}_t(y) = \arg\min_x \ t\|x\|_1 + \frac{1}{2}\|x - y\|_2^2.$$

(d) 给出求解问题(11)的近似点梯度算法及其步长的取法，写出收敛性(复杂度分析)结果。

(e) 给出求解问题(11)的Nesterov加速算法及其步长的取法，写出收敛性(复杂度分析)结果。

(f) 引入合适的拆分写出问题(11)的等价形式，写出求解该等价形式的增广拉格朗日函数法。要求明确写出如何求解增广拉格朗日函数子问题。

(g) 继上一小问: 写出求解该等价形式的交替方向乘子法(ADMM)。要求推导并明确写出每一个子问题的显式解。

(h) 写出问题(11)的对偶问题，写出求解该对偶问题的增广拉格朗日函数法。要求明确写出如何求解增广拉格朗日函数子问题。

(i) 继上一小问: 写出求解该对偶问题的交替方向乘子法(ADMM)。要求推导并明确写出每一个子问题的显式解。

23. 给定矩阵$A \in \mathbb{R}^{m\times n}$，向量$b \in \mathbb{R}^m$。证明以下两种情况中有且仅有一种成立：

(a) 存在某一个$x \geq 0$使得$Ax = b$.

(b) 存在某一个p使得$A^\top p \geq 0$且$b^\top p < 0$.

24. 令$x_{[i]}$为$x \in \mathbb{R}^n$的从大到小排列的第i个分量，$0 < r \leq n$是给定的正整数。定义函数

$$f(x) = x_{[1]} + x_{[2]} + \cdots + x_{[r]}.$$

(a) 证明$f(x)$是凸函数。

(b) 计算$f(x)$的次梯度。

25. 证明：d^*是信赖域子问题

$$\min_d \quad m(d) = f + g^\mathrm{T} d + \frac{1}{2} d^\mathrm{T} B d, \quad \text{s.t.} \quad \|d\|_2 \leq \Delta \tag{12}$$

的全局极小解当且仅当d^*是可行的且存在$\lambda \geq 0$使得

$$(B + \lambda I)d^* = -g, \tag{13a}$$

$$\lambda(\Delta - \|d^*\|) = 0, \tag{13b}$$

$$B + \lambda I \succeq 0. \tag{13c}$$

26. 令$f(x)$为闭凸函数，

$$y \in \partial f(x) \Longleftrightarrow x \in \partial f^*(y) \Longleftrightarrow x^T y = f(x) + f^*(y).$$

27. 推导二阶锥$C = \{(x,t) \in \mathbf{R}^{n\times 1} | \|x\|_2 \leq t\}$的投影算子.

28. 令$h(x)$为适当闭凸函数，定义邻近算子：

$$\mathrm{prox}_h(x) = \arg\min_u \left(h(u) + \frac{1}{2}\|u - x\|_2^2 \right).$$

(a) 证明Moreau分解

$$x = \mathrm{prox}_h(x) + \mathrm{prox}_{h^*}(x).$$

(b) 证明prox_h是固定非扩张的

$$\|\mathrm{prox}_h(x) - \mathrm{prox}_h(y)\|_2 \leq \|x - y\|_2.$$

(c) 令$f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$为梯度$L_f$-利普希茨连续函数。固定任意$t > L_f$，对于任何$x \in \mathrm{dom}\, h$和定义

$$x^+ = \mathrm{prox}_{h/t}\left(x - \frac{1}{t}\nabla f(x) \right),$$

我们有

$$f(x^+) + h(x^+) \leq f(x) + h(x) - \frac{t - L_f}{2}\|x^+ - x\|_2^2.$$

29. 给定对称矩阵$C, A_i \in \mathbb{R}^{n\times n}$，向量$b \in \mathbb{R}^m$。考虑半定规划：

$$\begin{aligned} \min_X \quad & \langle C, X \rangle \\ \text{s.t.} \quad & \langle A_1, X \rangle = b_1, \\ & \cdots \\ & \langle A_m, X \rangle = b_m, \\ & X \succeq 0, \end{aligned} \tag{14}$$

其中$\langle C, X \rangle = \sum_{i,j} C_{ij} X_{ij}$，$X \succeq 0$指$X$为半正定矩阵。

(a) 写出问题(14)的对偶问题。

(b) 写出问题(14)的最优性(KKT)条件（需写出充要条件，注意分别写清楚假设条件）。

(c) 考虑直接求解问题(14):

i. 写出增广拉格朗日函数算法，要求写出具体的增广拉格朗日函数形式和乘子更新格式；

ii. 写出该增广拉格朗日函数(关于X)的梯度和海瑟矩阵，并计算梯度的利普希茨常数；

iii. 写出极小化增广拉格朗日函数的投影梯度算法，给出步长选择并简要讨论该算法的收敛性（复杂度分析）结果。

(d) 考虑求解问题(14)的对偶问题:

i. 写出交替方向乘子法(ADMM)，要求写出每一个子问题的最优解和乘子更新格式。

ii. 写出增广拉格朗日函数算法，要求: 1) 将半定变量消掉，写出具体的增广拉格朗日函数形式和乘子更新格式。2) 计算该增广拉格朗日函数的梯度，并验证是否二次可微?

30. 假设$f(x)$是适当且闭的强凸函数, 其强凸参数为$\mu > 0$, h是闭凸函数，$A \in \mathbb{R}^{m\times n}$为实数矩阵. 考虑如下形式的问题：

$$\min_{x\in\mathbb{R}^n} \quad \psi(x) = f(x) + h(Ax). \tag{15}$$

(a) 令$f^*(y)$是$f(x)$的共轭函数，证明$f^*(y)$在全空间$\mathbb{R}^n$上有定义，且$f^*(y)$是梯度$\frac{1}{\mu}$-利普希茨连续的可微函数.

(b) 利用共轭函数写出(15)的拉格朗日对偶问题，要求该对偶问题由f和h共轭函数定义，且只有一个对偶变量z.

(c) 写出求解(b)中对偶问题关于对偶变量z步长为t的近似点梯度算法，给出步长选择并简要讨论该算法的收敛性（复杂度分析）结果。

(d) 引入约束$y = Ax$，写出与问题(15)等价的约束优化问题：

$$\begin{aligned} \min \quad & f(x) + h(y), \\ \text{s.t.} \quad & y = Ax. \end{aligned} \tag{16}$$

进一步写出约束优化问题(16)的拉格朗日函数和增广拉格朗日函数

$$\begin{aligned} L(x, y, z) &= f(x) + h(y) - z^{\mathrm{T}}(y - Ax), \\ L_t(x, y, z) &= f(x) + h(y) - z^{\mathrm{T}}(y - Ax) + \frac{t}{2}\|y - Ax\|^2, \end{aligned}$$

证明(c)中给出的迭代格式与如下算法等价

$$\begin{aligned} x^{k+1} &= \arg\min_x L(x, y^k, z^k), \\ y^{k+1} &= \arg\min_y L_t(x^{k+1}, y, z^k), \\ z^{k+1} &= z^k + t(Ax^{k+1} - y^{k+1}). \end{aligned} \tag{17}$$